

吡虫啉莫昔克丁滴剂(猫用)说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称:吡虫啉莫昔克丁滴剂(猫用)

商品名称:莫爱佳

英文名称:Imidacloprid and Moxidectin Spot-on Solutions (for Cats)

汉语拼音: Bichonglin Moxikeding Dijì (Mao Yong)

【主要成分】吡虫啉、莫昔克丁

【性状】本品为黄色至棕黄色的液体。

【药理作用】抗寄生虫药。

药效学 吡虫啉为新一代氯代烟碱杀虫剂,对昆虫的中枢神经系统突触后烟碱型乙酰胆碱受体具有较高亲和性,可抑制乙酰胆碱活性,导致寄生虫麻痹和死亡。对成年蚤和各个阶段幼蚤有效,对环境中幼蚤也有杀灭作用。莫昔克丁的作用机理与阿维菌素和伊维菌素相似,对体内外寄生虫尤其是线虫和节肢动物具有良好的驱杀作用,其驱杀作用机理在于促进神经递质γ-氨基丁酸(GABA)的释放,增加其与突触后受体的结合力,氯离子通道开放。莫昔克丁对谷氨酸介导的氯离子通道也具有选择性和高亲和力,从而干扰神经肌肉间的信号传递,使虫体松弛麻痹,导致虫体死亡。线虫的抑制性中间神经元和兴奋性运动神经元是其作用部位,而节肢动物的作用部位是神经肌肉接头。二者联合使用,具有协同作用。

药动学 首次给药后,吡虫啉在当日迅速分布到猫体表,并在给药期间始终在体表留存。给药后1~2日,莫昔克丁在猫体内的血药浓度达到最高,一个月内分布到全身并缓慢代谢排出。

【适应症】用于预防和治疗猫的体内、外寄生虫感染。预防和治疗跳蚤感染(猫栉首蚤),治疗耳螨感染(耳痒螨)治疗胃肠道线虫感染(猫弓首蛔虫和管形钩口线虫的成虫、未成熟成虫和L4期幼虫),预防心丝虫病(犬恶丝虫的L3和L4期幼虫)。并可辅助治疗因跳蚤引起的过敏性皮炎。

【用法与用量】以本品计。外用:一次量,每1kg体重,猫0.1ml。预防或治疗期间,每月给药一次。为防止舔舐,仅限于猫头后颈部皮肤给药。

猫体重(kg)	适用产品的类型	体积(ml)	吡虫啉(mg/kg体重)	莫昔克丁(mg/kg体重)
≤4kg	小猫用	0.4ml	不低于10	不低于1
>4~8kg	大猫用	0.8ml	10~20	1~2
>8kg	符合规格的产品组合使用			

预防和治疗跳蚤感染:一次给药可以在4周内防止跳蚤再次感染。环境中已经存在的蚤蛹可在0周或更长时间孵化,用药时长取决于当地气候。为了切断跳蚤在自然环境中的生活史,使用本品应与环境处理相结合。

治疗耳螨感染:单次给药,给药后30日经兽医检查评估后决定是否需要进行第二次给药。

预防心丝虫病:对于生活在或经过犬恶丝虫流行区域的猫,可全年或在蚊子(中间宿主,携带、传播心丝虫幼虫)活动季节前一个月使用本品,每月一次,直至蚊子活动结束后一个月。为确定治疗方案,建议最好在每月的同一日给药。当用本品替换其他心丝虫预防产品时,首次使用应在其他药物最后一次给药后的一个月内进行。

【不良反应】

1.本品可引起短暂的瘙痒,动物偶尔(<1/10000<发生率<10/10000)出现毛发粘连、红斑或呕吐,这些症状不需处理即可消失。使用本品动物可能偶尔会引起局部过敏反应。

2.给药后,如果动物舔舐了给药部位,极个别(<1/10000)可能会出现一过性的神经症状,如兴奋、震颤、眼科症状(瞳孔放大、瞳孔反射减弱和眼球震颤)、呼吸异常、流涎和呕吐等;极个别会出现短暂的行为改变,如不愿运动、兴奋和食欲不振等。

【注意事项】

1.禁用于9周龄以下的猫。禁用于对本品及辅料过敏的猫。本品未对怀孕及哺乳期内猫应进行安全性评价,使用前需遵从兽医建议。

2.1kg以下的猫在使用本品时需遵从兽医建议。

3.生活在或去过心丝虫流行区域的猫,在使用本品前,建议对大于6月龄的猫进行心丝虫感染检查。如果确定感染,则应按照目前科学的方法予以治疗。因为有心丝虫成虫感染的猫在使用本品后可能会引发严重不良事件,包括死亡。

4.需防止柯利犬、古英国牧羊犬和相关品种经口舔舐本品。

5.病猫和体质虚弱的猫使用时需遵从兽医建议。

6.本品勿用于犬。

7.使用本品过程中,勿让药管内的药物接触被给药动物或其它动物的眼睛和口腔。防止用完药的动物互相舔毛。药物未干之前,勿触摸或修剪毛发。

8.在给药期间,猫偶尔1次或2次接触水不会明显影响药物的疗效。但猫频繁使用香波洗澡或浸泡在水中可能会影响药物的疗效。

9.避免儿童接触本品。

10.贮藏请勿超过30°C,勿超过有效期使用。

11.对本品过敏的人员请勿给药。

12.给药时,使用人员应避免本品接触皮肤、眼睛和口腔,勿进食、喝水或抽烟;给药后,应洗净双手。如不慎溅到皮肤,立即用肥皂和水清洗;如不慎溅入眼睛,立即用清水冲洗。如症状无好转,请持说明书就医。

13.目前,无针对本品的特效解救药;如误食,口服活性炭可有助于解毒。

14.本品中的溶剂有可能会污染皮革、织物、塑料和油漆表面等材料,在给药部位干燥以前,防止这些材料接触给药部位。

15.勿使本品进入地表水。

16.未使用完的药物及包材,应按当地要求进行无害化处理。

【休药期】无需制定。

【规格】0.4ml:吡虫啉40mg+莫昔克丁4mg

【包装】(1) 1支/盒 (2) 3支/盒 (3) 6支/盒

【贮藏】密封保存。

【有效期】36个月

【批准文号】兽药字110803211

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话:0571-23208916

传真:0571-23208915

网址:www.hisunah.com

吡虫啉莫昔克丁滴剂(猫用)说明书

宠物用 外用

【兽药名称】

通用名称:吡虫啉莫昔克丁滴剂(猫用)

商品名称:莫爱佳

英文名称:Imidacloprid and Moxidectin Spot-on Solutions (for Cats)

汉语拼音:Bichonglin Moxikeding Diji (Mao Yong)

【主要成分】吡虫啉、莫昔克丁

【性状】本品为黄色至棕黄色的液体。

【药理作用】抗寄生虫药。

药效学 吡虫啉为新一代氯代烟碱杀虫剂,对昆虫的中枢神经系统突触后烟碱型乙酰胆碱受体具有较高亲和性,可抑制乙酰胆碱活性,导致寄生虫麻痹和死亡。对成年蚤和各个阶段幼蚤有效,对环境中幼蚤也有杀灭作用。莫昔克丁的作用机理与阿维菌素和伊维菌素相似,对体内外寄生虫尤其是线虫和节肢动物具有良好的驱杀作用,其驱虫作用机理在于促进神经递质γ-氨基丁酸(GABA)的释放,增加其与突触后受体的结合力,氯离子通道开放。莫昔克丁对谷氨酸介导的氯离子通道也具有选择性和高亲和力,从而干扰神经肌肉间的信号传递,使虫体松弛麻痹,导致虫体死亡。线虫的抑制性中间神经元和兴奋性运动神经元是其作用部位,而节肢动物的作用部位是神经肌肉接头。二者联合使用,具有协同作用。

药动学 首次给药后,吡虫啉在当日迅速分布到猫体表,并在给药期间始终在体表留存。给药后1~2日,莫昔克丁在猫体内的血药浓度达到最高,一个月内分布到全身并缓慢代谢排出。

【适应症】用于预防和治疗猫的体内、外寄生虫感染。预防和治疗跳蚤感染(猫栉首蚤),治疗耳螨感染(耳痒螨)治疗胃肠道线虫感染(猫弓首蛔虫和管形钩口线虫的成虫、未成熟成虫和L4期幼虫),预防心丝虫病(犬恶丝虫的L3和L4期幼虫)。并可辅助治疗因跳蚤引起的过敏性皮炎。

【用法与用量】以本品计。外用:一次量,每1kg体重,猫0.1ml。预防或治疗期间,每月给药一次。为防止舔舐,仅限于猫头后颈部皮肤给药。

猫体重(kg)	适用产品的类型	体积(ml)	吡虫啉(mg/kg体重)	莫昔克丁(mg/kg体重)
≤4kg	小猫用	0.4ml	不低于10	不低于1
>4~8kg	大猫用	0.8ml	10~20	1~2
>8kg	将合适规格的产品组合使用			

预防和治疗跳蚤感染:一次给药可以在4周内防止跳蚤再次感染。环境中已经存在的蚤蛹可在6周或更长时间孵化,用药时长取决于当地气候。为了切断跳蚤在自然环境中的生活史,使用本品应与环境处理相结合。

治疗耳螨感染:单次给药,给药后30日经兽医检查评估后决定是否需要第二次给药。

预防心丝虫病:对于生活在或经过犬恶丝虫流行区域的猫,可全年或在蚊子(中间宿主,携带、传播心丝虫幼虫)活动季节前一个月使用本品,每月一次,直至蚊子活动结束后一个月。为确定治疗方案,建议最好在每月的同一日给药。当用本品替换其他心丝虫预防产品时,首次使用应在其他药物最后一次给药后的一个月内进行。

【不良反应】

1.本品可引起短暂的瘙痒,动物偶尔(<1/10000<发生率<10/10000)出现毛发粘连、红斑或呕吐,这些症状不需处理即可消失。使用本品动物可能偶尔会引起局部过敏反应。

2.给药后,如果动物舔舐了给药部位,极个别(<1/10000)可能会出现一过性的神经症状,如兴奋、震颤、眼科症状(瞳孔放大、瞳孔反射减弱和眼球震颤)、呼吸异常、流涎和呕吐等;极个别会出现短暂的行为改变,如不愿运动、兴奋和食欲不振。

【注意事项】

1.禁用于9周龄以下的猫。禁用于对本品及辅料过敏的猫。本品未对怀孕及哺乳期猫应进行安全性评价,使用前需遵从兽医建议。

2.1kg以下的猫在使用本品时需遵从兽医建议。

3.生活在或去过心丝虫流行区域的猫,在使用本品前,建议对大于6月龄的猫进行心丝虫感染检查。如果确定感染,则应按照目前科学的方法予以治疗。因为有心丝虫成虫感染的猫在使用本品后可能会引发严重不良事件,包括死亡。

4.需防止柯利犬、古英国牧羊犬和相关品种经口舔舐本品。

5.病猫和体质虚弱的猫使用时需遵从兽医建议。

6.本品勿用于犬。

7.使用本品过程中,勿让药管内的药物接触被给药动物或其它动物的眼睛和口腔。防止用完药的动物互相舔毛。药物未干之前,勿触摸或修剪毛发。

8.在给药期间,猫偶尔1次或2次接触水不会明显影响药物的疗效。但猫频繁使用香波洗澡或浸泡在水中可能会影响药物的疗效。

9.避免儿童接触本品。

10.贮藏请勿超过30°C,勿超过有效期使用。

11.对本品过敏的人员请勿给药。

12.给药时,使用人员应避免本品接触皮肤、眼睛和口腔,勿进食、喝水或抽烟;给药后,应洗净双手。如不慎溅到皮肤,立即用肥皂和水清洗;如不慎溅入眼睛,立即用清水冲洗。如症状无好转,请持说明书就医。

13.目前,无针对本品的特效解救药;如误食,口服活性炭可有助于解毒。

14.本品中的溶剂有可能会污染皮革、织物、塑料和油漆表面等材料,在给药部位干燥以前,防止这些材料接触给药部位。

15.勿使本品进入地表水。

16.未使用完的药物及包材,应按当地要求进行无害化处理。

【休药期】无需制定。

【规格】0.8ml:吡虫啉80mg+莫昔克丁8mg

【包装】(1) 1支/盒 (2) 3支/盒 (3) 6支/盒

【贮藏】密封保存。

【有效期】36个月

【批准文号】兽药字110803212

【生产企业】

浙江海正动物保健品有限公司

地址:浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路208号

电话:0571-23208916

传真:0571-23208915

网址:www.hisunah.com